

Undersøgelse af Vandrefalken i Sydgrønland



Feltrapport 2012

Knud Falk¹ og Søren Møller²

www.vandrefalk.dk

¹ Ljusstöparbacken 11b, 11765 Stockholm, E-mail: knudfalk@hotmail.com

² Roskilde Universitetsbibliotek, Box 258, 4000 Roskilde, E-mail: moller@ruc.dk



Indhold

Indledning	3
1.1. Baggrund og projektets hidtidige resultater.....	3
1.2. Formål.....	3
2. Feltarbejde	4
3. Metoder og resultater.....	5
3.1. Ungeproduktion.....	6
3.2. Variation i yngletiden	7
3.3. Miljøprøver	9
3.4. Andre resultater.....	9
Bilag 1: Udskiftning af ynglende hunner.....	11
Bilag 2: Genmeldinger	12
Bilag 3: Ringmærkningsliste 2012	13
Bilag 4: Referencer.....	14



Abstract

This report presents results from the 30th field season of the project "Investigations of the Peregrine Falcon in South Greenland". Following analyses of data from the first 22 years, the primary objectives of the study since 2005 has shifted towards monitoring of a fixed sample of nesting sites where reproduction, timing of breeding and monitoring of loads and effects of contaminants are carried out annually. Twelve sites have been

selected, and in 2012 all 12 sites were checked, producing 2.8 young/successful site and 1.9 young/ occupied territory. Fragments from hatched eggs were collected in 6 nests, and moulted feathers from the adults collected at 4 nests. Among 9 nests, the first egg hatched between 1 July and 10 July (mean 4 July), one day later than the average for 1981-2012. In addition, five breeding female Peregrine Falcons were fitted with geolocators.

Indledning

1.1. Baggrund og projektets hidtidige resultater

Vandrefalken har verden over fungeret som monitoringsorganisme for pesticidbelastningen i det naturlige miljø, og derfor indledte vi i 1981 undersøgelser af Vandrefalken i Sydgrønland. Vi har studeret mange forhold og indsamlet miljøprøver i nu 30 år og de langsigtede undersøgelser har bl.a. vist:

1. En gradvis forbedring i tykkelsen på falkenes æg (0.19% bedre per år).¹ Det betyder, at falkenes miljø ganske langsomt bliver mindre belastet med sprøjtegiften DTT, som blev forbudt over det meste af verden i 1970'erne samt andre skalfortyndende stoffer. Det varer dog flere årtier før skaltykkelsen er tilbage på niveauet fra før DTT blev benyttet, og falkene er stadigt meget belastet af en lang række andre miljøgifte.^{2,3}
2. En række nye "problemstoffer" – de såkaldte 'bromerede flammehæmmere' – findes i falkene i stigende mængde.⁴
3. Vandrefalkene i Sydgrønland har både en meget høj ungeproduktion – i gennemsnit 2.9 unger hos hvert succesfuldt yngleforsøg. De mange unger skal kompensere for en meget høj dødelighed hos de voksne ynglefugle. Ved at ringmærke de voksne ynglefugle, og genfange dem på samme rede år efter år har vi vist at omkring 25% af de voksne ynglende hunner forsvinder hvert år – den højeste udskiftning for Vandrefalke noget sted i Verden.
4. De grønlandske Vandrefalke trækker om vinteren til Syd- og Mellemamerika, hvor de sandsynligvis henter det meste af deres miljøgifte. Om sommeren i Sydgrønland lever falkene især af småfugle, som bærer meget lidt gift. En afgiftning af falkene i sommermånederne er formentlig årsagen til at falkebestanden har været sund her, mens den gik tilbage i store dele af Verden i 1950-1970erne.
5. Selv om det ikke har kunnet påvises med sikkerhed, tyder foreløbige undersøgelser på at falkene i løbet af 1900-tallet har fået et højere indhold af kviksølv. Det gælder også ungerne, hvilket viser at belastningen også stammer fra det arktiske miljø.⁵
6. Den nyeste opdagelse – som endnu ikke er analyseret i detaljer – er at falkenes yngletid "skrider" så de lægger æg stadigt tidligere. Det er sandsynligvis forårsaget af klimaændringer.

De fleste af resultaterne er eller bliver offentliggjort i internationale tidsskrifter (se referencer).

På baggrund af de opnåede resultater blev projektet fra 2005 omlagt til et mere "slankt" og målrettet monitoringsprogram som beskrevet nedenfor.

1.2. Formål

Det primære formål med dette projekt er at indsamle data, som kan belyse igangværende og kommende ændringer i miljøet – både miljøkemiske, klimatiske og land-skabsmæssige – og disses effekter på Vandrefalken i Sydgrønland.

Projektet bygger videre på den lange data-serie siden 1981, men i et mere systematisk og mindre ressourcekrævende program. Mange vigtige miljøforhold kan kun måles ved en langsigtet indsats; fx. har de gradvise, men markante ændringer i falkenes belastning af forskellige miljøgifte kun kunnet påvises fordi vi i over 20 år har samlet prøver fra falkenes æg og fjer. Det er hensigten fortsat at:

- indsamle miljøprøver for at følge udviklingen i falkenes belastning af diverse miljøgifte,

- foretage standard-registrering af falkebestandens reproduktionsevne, og
- registrere tidsmæssige forskydninger og årlige variationer i falkenes yngletid – en sensitiv parameter for måling af effekter af klimaændringer.

Måle-parametrene (se metoder nedenfor) er udvalgt med henblik på at opnå den maksimale udnyttelse af de allerede indsamlede data. Monitoringsprogrammet er tilrettelagt så det relativt let og billigt kan gennemføres af to personer i felten over en periode på 14-21 dage.

Som noget nyt har vi i 2012 udstyret fem ynglende vandrefalkehunner med dataloggere. Dataloggerne kan med stor præcision registrere lysintensiteten gennem døgnet over en periode på flere år og opbevare disse data indtil fuglene kan genfanges de følgende år og data downloades til en computer. De indsamlede data gør det muligt at beregne fuglenes geografiske positioner to gange i døgnet (middag og midnat) med en præcision på ca. 100 km. De benyttede dataloggere vejer ca. 1,8 g og monteres på ringen (se forsidefoto). Arbejdet vil foregå i samarbejde med canadiske og amerikanske vandrefalkeforskere og vil omfatte studier af Vandrefalke af samme race (*F. p. tundrius*) fra dens østligste udbredelsesområde (Grønland) til dens vestligste (Alaska) for en samlet analyse af racens træk- og overvintringsområder

2. Feltarbejde

Projektet blev i 2012 støttet af Bodil Pedersen Fonden. Feltarbejdet blev udført i perioden 4-31. juli 2012 af Søren Møller (SM) og Knud Falk (KF) med assistance fra Lena Hansson (LH) og Marianne Lind (ML). Perioden blev valgt af praktiske grunde. Vejrforholdene i 2012 var i perioder domineret af blæst og regn, hvilket medførte at feltarbejde i perioder måtte opgives midlertidigt. Besøg mindst én gang ved alle lokaliteter blev dog gennemført. Desuden blev enkelte lokaliteter som ikke er blandt de 12 udvalgte besøgt. De enkelte dage forløb som følger:

4. juli: Fly København → Narsarsuaq (KF, SM, LH). Udpakning af gods og klargøring af båd.
5. juli: Vedvarende regn – udpakning af gods etc.
6. juli: Stadig vedvarende regn.
7. juli: Lokalitet 1. Ring og datalogger monteret på hun.
8. juli: Narsarsuaq → Qasiarsuk. Lokalitet 63.
9. juli: Feltarbejde ikke mulig (blæst og regn).
10. juli: Lokalitet 66.
11. juli: Feltarbejde ikke mulig (blæst og regn).
12. juli: Lokalitet 29.
13. juli: Lokalitet 61.
14. juli: Lokalitet 2.
15. juli: Lokalitet 23. Ring og datalogger monteret på hun.
16. juli: Qasiarsuk → Narsarsuaq
17. juli: Fly København → Narsarsuaq (ML) og Narsarsuaq → København (LH).
18. juli: Narsarsuaq → Sdr. Igaliko. Lokalitet 6. Ring og datalogger monteret på hun.
19. juli: Lokalitet 32. Ring og datalogger monteret på hun.
20. juli: Lokalitet 67.
21. juli: Sdr. Igaliko → Eqaluit.
22. juli: Lokalitet 7. Eqaluit → Qaqortoq.
23. juli: Lokalitet 18.
24. juli: Narsarsuaq → København (KF).
25. juli: Qaqortoq → Qanisartuut. Lokalitet 8.
26. juli: Lokalitet 42. Ring og datalogger monteret på hun. Qanisartuut → Igaliko.
27. juli: Feltarbejde ikke muligt (blæst og regn).
28. juli: Igaliko → Narsarsuaq.
29. juli: Praktiske gøremål i forbindelse med pakning.
30. juli: Lokalitet 1.
31. juli: Narsarsuaq → København (SM, ML).

3. Metoder og resultater

Vi har udvalgt 12 falketerritorier, som årligt bliver kontrolleret med henblik på indsamling af data vedrørende følgende parametre:

- Kuldstørrelse: Det totale antal æg eller unger,
- Ungeproduktion: Antal unger, der når ringmærkningsdygtig alder (12 dage),
- Klækningstidspunkt: Dato for første ægs klækning (skønnes ud fra vurdering af ungernes alder, eller måling/vejning af de rugede æg),
- Æg: Golde (rådne) æg indsamles til senere analyse for især bromerede flammehæmmere, men også de klassiske pesticider og PCB,
- Ægskal-fragmenter: Rester af de klækkede æg indsamles med henblik på måling af skaltykkelse (indikator for DDT),
- Fjer: Fældede fjer fra de voksne falke indsamles.

For at sikre at hele programmet kan gennemføres også i de kommende år har vi udvalgt de 12 falketerritorier ud fra logistiske kriterier, det vil primært sige en spredning fra kyst til indland og klippens beskaffenhed i forhold til klatring. Det skønnes muligt for to personer i felten under skiftende arbejds- og vejforhold at nå rundt til samtlige lokaliteter (herunder også nogle få genbesøg) over en periode på 14-21 dage.




Der blev således i 2012 foretaget i alt 13 lokalitetsbesøg ved de 12 kernelokaliteter. Der blev desuden foretaget to besøg ved andre lokaliteter (18 og 67) – ingen af disse var produktive. Resultaterne af de enkelte lokalitetsbesøg kan resumeres således:

Tabel 1. Lokalitetsbesøg


Lok nr.	Dato	Antal Æg	Antal unger	Klækkedato (1. unge)	Bemærkninger	Prøver Samlet
1	7. juli + 30. juli	1	3	5. juli	Datalogger monteret på hun	Skalfragmenter
2	14. juli	0	0	-	Både han og hun set	
6	18. juli	1	2	3. juli	Datalogger monteret på hun	Æg, skalfragmenter, fjer
7	22. juli	0	3	5. juli		Skalfragmenter, fjer
8	25. juli	0	3	5. juli	Redehylden observeret	
23	15. juli	0	2	2. juli	Datalogger monteret på hun	Skalfragmenter
29	12. juli	0	0	-	Både han og hun set	
32	19. juli	0	3	1. juli	Datalogger monteret på hun	Skalfragmenter
42	26. juli	0	3	10. juli	Datalogger monteret på hun	Skalfragmenter, fjer
61	13. juli	0	3	1. juli		Skalfragmenter
63	11. juli	0	0	-	Han observeret	
66	10. juli	0	0	-	Han observeret	

3.1. Ungeproduktion

Ved besøg på de enkelte falkelokalteter søges fastslået om territoriet er besat (tilstedeværelse af territoriehævdende han og hun) og om der er gjort yngleforsøg (rede med æg eller unger). Observationer foran eller på toppen af redefjeldet vil i reglen i løbet af nogle få timer afsløre om territoriet er besat. De tilstedeværende falkes adfærd vil herefter kunne benyttes til at afsløre redens placering på fjeldet. Endelig vil klatring til reden vise ynglesuccesen. Et succesfuldt par er her defineret som et par der får mindst én unge, som når en alder på 12 dage (ringmærkningsmulig alder). For yderligere beskrivelse af metoder henvises til tidligere feltrapporter og Falk & Møller (1988⁶). Denne metode har været benyttet uændret siden projektets start, men fra 1989 har den sydligste del af undersøgelsesområdet i Nanortalik kommune ikke været besøgt, og fra 2005 er antallet af besøgte territorier yderligere indskrænket til 12 (se ovenfor). Antal unger per succesfuldt par (2,8) og per besat territorium (1,8) i 2012 er en anelse under gennemsnittet for alle år. (Tabel 2 og Fig. 1). I Fig. 2 ses ungeproduktionen i de udvalgte monitorings-territorier hvor tendensen er positiv, men kun med meget svag korrelation; gennemsnittet er visse år beregnet på meget få territorier.



Figur 1. De sydgrønlandske vandrefalkes ungeproduktion 1981-2012



Figur 2. Ungeproduktion 1981-2012 i udvalgte monitorings-territorier.

Tabel 2. Resume af feltindsats samt de sydgrønlandske vandrefalkes territoriebesættelse og reproduktion 1981-2012.

ÅR	TERRITORIEBESÆTTELSE				REPRODUKTION		
	antal besøgt	Besatte	Succesfulde	Succes ukendt	total unger	Unger/besat territorium ^b	unger/ succesfuldt par
1981	15	13	5 (+2) ^a	3	14	1.8	2.8
1982	16	11	5 (+2) ^a	1	16	1.8	3.2
1983	19	13	8	2	21	1.9	3.2
1984	18	11	8	0	20	1.8	2.5
1985	16	10	6	0	15	1.5	2.5
1986	22	15	8	1	25	1.8	3.1
1987	17	14	8	0	24	1.7	3.0
1988	16	13	10	1	27	2.3	2.7
1989	14	14	6	1	18	1.4	3.0
1990	16	13	7	0	21	1.6	3.0
1991	19	14	6 (+1) ^a	4	15	1.7	2.5
1992	19	17	5 (+1) ^a	0	14	0.9	2.8
1994	20	15	7	0	22	1.5	3.1
1995	20	16	8	0	27	1.7	3.4
1996	18	13	7	0	21	1.6	3.0
1997	15	13	10	0	26	2.0	2.6
1998	15	13	8	0	26	2.0	3.3
1999	16	13	9	0	26	2.0	2.9
2000	18	15	9	3	20	1.7	2.2
2001	14	13	8	4	24	2.7	3.0
2002	14	11	8 (+1) ^a	0	20	2.0	2.5
2003	12	11	7 (+2) ^a	0	24	2.7	3.4
2005	12	11	5	3	14	1.8	2.8
2006	13	13	8 (+1) ^a	0	27	2.3	3.4
2007	13	13	9	2	27	2.5	3.0
2008	11	11	6	4	22	3.1	3.7
2009	12	10	8	1	26	2.9	3.3
2010	11	11	7	0	21	1.9	3.0
2011	12	12	8	1	25	2.3	3.1
2012	12	12	8	0	22	1.8	2.8
Total		384	222	30	650	1.9	2.9

^a i parentes er angivet antal succesfulde par med ubestemt antal unger

^b besatte territorier med ukendt succes udeladt af beregningerne

3.2. Variation i yngletiden

Der er en del variation i tidspunktet for falkenes æglægning, som kan påvirkes af en række vejrfaktorer – og på langt sigt kan sæsonen tænkes at skride som følge af klimaændringer. Ved hvert redebesøg samles derfor data om yngletidspunktet ved forskellige metoder:

Hvis reden indeholder et kuld æg kan måling (længde og bredde) og vejning af de enkelte æg benyttes til at vurdere hvor længe de har været ruget, og dermed hvornår de kan forventes at klække. Præmisserne er:

- Rugetiden er i gennemsnit 33 dage (White et al. 2002⁷).
- Æggene taber ca. 16.3% af deres vægt fra rugningen begynder og til ægget språr
- Æggets start-vægt kan beregnes ved $(L \times B^2 \times 0.0005474)$ – hvor L=længde og B=bredde i mm.


Æggene vejes til nærmeste 0.1 g på en elektronisk vægt, og længde/bredde måles med skydelære til nærmeste 0.1 mm. Rugetiden beregnes på en programmeret lommeregner mens observatøren er i reden, for at kunne gentage målingerne hvis resultaterne virker inkonsistente. Metoden giver den forventede klække dato med 2-3 dages usikkerhed. Et antal genbesøg i rederne har bekræftet metodens effektivitet.



Hvis reden indeholder unger bestemmes deres alder ud fra:

- et foto-katalog/manual (Clum et al. 1996⁸), og
- alderen beregnes ud fra vingelængden (VL, i cm) efter formlen $(VL + 0.84)/0.69$ (White et al. 2002⁶).

I 2012 kunne klække-tidspunktet bestemmes for alle 8 succesfulde reder, hvor klække-datoen for æg i kullet varierede fra 1. juli til 10. juli (gennemsnit 4. juli, hvilket er en dag senere end gennemsnittet for hele perioden 1981-2012). En foreløbig sammenligning af første klække dato gennem alle undersøgelsesår antyder at falkene gradvist yngler tidligere (se Fig 3). Dog er ikke alle data fra de tidlige år medtaget, idet en egentlig statistisk analyse afventer en samlet revision af projektets database-struktur.



Figur 3. Dag for klækning af første æg i hvert kuld i årene 1981-2012 (Obs: foreløbige data)

3.3. Miljøprøver

For at fortsætte tidsserien af prøver til at måle falkenes belastning af miljøgifte indsamles golde æg og skalfragmenter.



Fragmenter er de tilbageværende rester fra klækkede æg – i 2012 har vi indsamlet skaller i 7 reder.



Af og til findes golde æg liggende tilbage i reder med halvstore unger. Indsamlede æg opskæres og indholdet opbevares dybfrosset i kontaminantfri emballage. I 2012 er der indsamlet ét goldt æg.

Miljøprøverne er indsamlet med tilladelse fra Grønlands Hjemmestyre, og ført til Danmark med dispensation fra CITES reglerne for Liste I-arter (godkendte certifikater). Efter hjemkomst til Danmark opskæres hele æg så indholdet kan opbevares i fryser hos Danmarks Miljøundersøgelser, og skallerne tørres til måling af skaltykkelse sammen med skalfragmenterne.


3.4. Andre resultater

Mellem 1985 og 2003 har vi fanget/genfanget ynglende hunner ved ynglepladsen for at måle udskiftningen i ynglebestanden (se metode i tidligere feltrapporter).

Denne tidskrævende type undersøgelser har vi indstillet fra 2005-11 (se resultater frem til 2005 i Bilag 1), men har nu genoptaget adultfangsten for at udføre de beskrevne studier med geolocators.



Vandrefalke ringmærket i vores undersøgelsesområde – eller falke fanget med ring fra andre områder – giver oplysning om trækveje og overvintringsområder. Mærknings- og genfangstpladser for falke fra Sydgrønland er vist på kortet, mens en liste over alle 36 genmeldinger indtil 2012 findes i bilag 2. Det fremgår heraf, at de grønlandske falke kan trække langt ned i Sydamerika, men at en del bliver i Caribien vinteren over. Disse data er hovedsagelig baseret på genmeldinger af ungfugle. Mærkning af ynglende hunner med geolocators forventes at give et langt mere detaljeret billede af falkenes trækruter og fouragerings- og vinteropholdsområder.




Bilag 1: Udskiftning af ynglende hunner

Tab af hunner fra ynglebestanden af vandrefalke i Sydgrønland 1985-2005.

	Identificeret i territorier hvor hun også identificeres senere		Identificeret i andet territorium	Identificeret i samme territorium	Totalt antal genregistrerede	Maksimalt tab per år (%)	Minimalt tab per år (%)
	Max.	Min. ¹					
1985-86	5	4	0	3	3	40	25
1986-87	7	7	0	6	6	14	14
1987-88	9	9	0	7	7	22	22
1988-89	8	7	0	3	3	63	57
1989-90	8	6	0	4	4	50	33
1990-91	9	9	0	7	7	22	22
1991-92	8	8	0	6	6	25	25
1992-94	7	4	0	2	2	36	25
1994-95	7	7	0	6	6	14	14
1995-96	10	10	0	8	8	20	20
1996-97	9	9	0	9	9	0	0
1997-98	10	9	0	8	8	20	11
1998-99	8	8	0	7	7	13	13
1999-00	9	9	0	7	7	22	22
2000-01	9	8	0	7	7	22	13
2001-02	10	9	0	7	7	30	22
2002-03	7	7	0	7	7	0	0
2003-05	11	7	0	5	5	27	14
Total (max.)	151	137	0	109	109	28	20
Total (korr. ²)	151	137	1.93	109	110.9	27	19

¹ Antal ved en konservativ vurdering af udskiftningen. Lokaliteter hvor hunnen ikke er registreret er ikke medtaget som forsvundet, se tabel 2.

² Korrigeret for flytninger, jvf. Mattox 1995: 4.6%.



Bilag 2: Genmeldinger

Genmeldinger af sydgrønlandske vandrefalke, 1981-2012 (ekskl. genfangster af ynglende falke i samme territorium)

MÆRKET			GENMELDT		
Køn/alder	Sted	Dato	Dato	Sted	Bemærkning
Han/pull	Lok. 7	25/7-81	31/10-81	Mexico	Aflæst
Hun/2k	Texas	14/10-81	14/7-86	Lok. 49	Afl. Ynglefugl
Hun/pull	Lok. 55	25/7-86	14/12-87	Cuba	Skudt
Hun/pull	Lok. 32	27/7-83	14/03-88	Cuba	Skudt
Hun/pull	Lok. 6	20/7-86	23/4-88	Texas	Aflæst
Hun/pull	Lok. 55	25/7-86	11/7-88	Lok. 1	Aflæst
Hun/pull	Lok. 29	30/7-87	17/7-89	Lok. 24	Aflæst
Hun/ad	Lok. 6	20/7-89	1/8-89	Lok. 42	Fundet død
Hun/1k	Virginia	10/10-86	9/7-90	Lok. 6	Afl. Ynglefugl
Han/2k	Virginia	6/10-83	6/7-91	Lok. 6	Afl. Ynglefugl
Hun/pull	Lok. 51	19/7-91	15/10-91	Virginia	Aflæst og ring skiftet*
Han/pull	Sdr. Strømfjord	1/8-90	23/6-92	Eqaluit	Aflæst
Hun/ad	Lok. 32	20/7-89	Oktober 93	Virginia	Aflæst (PTT monteret)
Hun/pull	Lok. 8	11/7-90	2/7-94	Lok. 60	Afl. Ynglefugl
Hun/1k	Virginia (+ L51)	15/10-91	15/07-94	Lok. 13	Afl. Ynglefugl*
Hun/pull	Lok. 62	24/7-94	1/10-94	Virginia	Aflæst (ny ring monteret)
Hun/pull	Lok. 6	23/7-95	7/10-95	Virginia	Aflæst (ny ring monteret)
Hun/ad	Lok. 5	12/7-91	10/3-96	Argentina	Skudt
Hun/pull	Lok. 32	13/7-96	21/9-96	New Jersey	Fundet død
Han/pull	Lok. 7	25/7-96	26/9-96	Delaware	Aflæst (skadet fugl)
?/pull	Lok. 8	17/7-96	19/2-97	Grenada	Aflæst (skadet fugl)
?/pull	Lok. 6	17/7-92	Forår 97	Barbuda, WI	Skudt
Hun/pull	Sdr. Strømfjord	23/7-90	7/7-97	Lok. 2	Afl. Ynglefugl
Han/1k	New Jersey	16/10-89	1/7-98	Lok. 51	Afl. Ynglefugl
Hun/pull	Lok. 51	23/7-98	19/10-98	Texas	Aflæst
Hun/pull	Lok. 55	17/7-98	8/10-98	Virginia	Aflæst
Hun/pull	Lok. 32	22/7-97	12/1-98	Cuba	Skudt
Hun/pull	Sdr. Strømfjord	28/7-91	8/7-99	Lok. 51	Afl. Ynglefugl
Hun/pull	Lok. 7	25/7-96	10/7-99	Lok. 2	Afl. Ynglefugl
Hun/ad	Lok. 29	30/6-91	2/4-00	Nova Scotia	Død, kun få rester fundet
Hun/ad	Lok. 23	29/6-91	29/9-00	Narsaq	Aflæst (skadet fugl)
Han/pull	Lok. 8	20/7-97	ca. dec 2000	Costa Rica	Skudt
Hun/pull	Lok. 8	7/7-95	8/7-02	Lok. 29	Aflæst ynglefugl (siden 2000)
Hun/pull	Lok. 23	20/7-07	1/10-07	New Jersey	Aflæst
Han/pull	Lok. 1	22/7-07	28/10-08	Pitipo, Peru	Skudt
Hun/pull	Lok. 8	7/7-10	14/10-10	Maryland	Aflæst

* Samme fugl



Voksen han, lokalitet 6

Bilag 3: Ringmærkningsliste 2012

Ring nr.	Lokalitet	Dato	Type ¹	Køn ²	Alder	Enhed ³
3092251	60042	2012-07-26	M	F	16	D
3092252	60006	2012-07-18	M	F	15	D
3092253	60032	2012-07-19	M	F	18	D
3092254	60007	2012-07-22	M	F	18	D
3092255	61001	2012-07-30	M	F	24	D
3092256	61001	2012-07-30	M	F	24	D
3092257	61001	2012-07-30	M	F	24	D
4137647	61061	2012-07-13	M	F	12	D
4137648	61061	2012-07-13	M	F	10	D
4137649	61061	2012-07-13	M	M	10	D
4298311	61023	2012-07-15	M	M	14	D
4298312	61023	2012-07-15	M	F	10	D
4298313	60006	2012-07-18	M	M	11	D
4298314	60032	2012-07-19	M	M	16	D
4298315	60032	2012-07-19	M	M	19	D
4298316	60007	2012-07-22	M	M	15	D
4298317	60007	2012-07-22	M	M	18	D
4298318	60042	2012-07-26	M	M	13	D
4298320	60042	2012-07-26	M	M?	15	D

1: O = observation af ringmærket adult; M = mærkning

2: M = han (Male); F = hun (Female)

3: K = kalenderår (voksne): D = dage (unger)

Bilag 4: Referencer

-
- ¹ Falk, K., S. Møller & W.G. Mattox 2005. A long-term increase in eggshell thickness of Greenlandic Peregrine Falcons *Falco peregrinus tundrius*. Science of the Total Environment, 2006, 355 (1-3), 127-134.
- ² Sørensen, P.B., K. Vorkamp, M. Thomsen, K. Falk & S. Møller. Persistent organic pollutants (POPs) in the Greenland environment - Long-term temporal changes and effects on eggs of a bird of prey. National Environmental Research Institute, Denmark. 126 pp. NERI Technical report no. 509, 2004.
- ³ Katrin Vorkamp, Marianne Thomsen, Søren Møller, Knud Falk, Peter B. Sørensen. Persistent organochlorine compounds in peregrine falcon (*Falco peregrinus*) eggs from South Greenland: Levels and temporal changes between 1986 and 2003. Environment International. 2009, 35(2), 336-341. doi:10.1016/j.envint.2008.08.008
- ⁴ Vorkamp, K., Thomsen, M., Falk, K., Leslie, H., Møller, S. & Sørensen, P.B. Temporal development of brominated flame retardants in peregrine falcon (*Falco peregrinus*) eggs from Southern Greenland (1986-2003). Environmental Science and Technology 2005, 39 (21), 8199-8206.
- ⁵ Dietz, R., Riget, F.F., Boertmann, D., Sonne, C., Olsen, M.T., Fjeldsø, J., Falk, K., Kirkegaard, M., Egevang, C. Asmund, G., Wille, F. & Møller, S. 2006. Time Trends of Mercury in Feathers of West Greenland Birds of Prey During 1851-2003. Environmental Science & Technology. 2006, 40 (19), 5911-5916.
- ⁶ Falk, K. & S. Møller 1988. Status of the peregrine falcon *Falco peregrinus* in South Greenland: Population density and reproduction. - I: Cade, T.J., J.H. Enderson, C.G. Thelander & C.M. White (eds.) 1988. Peregrine falcon populations: Their management and recovery. - Proc. 1985 Peregrine Conf., Sacramento, The Peregrine Fund, Boise, Idaho.
- ⁷ White, C.M., Clum, N.J., Cade, T.C. & Hunt, W.G. 2002. The Birds of North America, No. 660.
- ⁸ Clum, N., Harrity, P. & Weck, H. 1996. Aging young Peregrines. Pp 37-63 i Cade, T.J., Enderson, J.H. & Linthicum, J. (eds): Guide to Management of Peregrine Falcons at the Eyrie. The Peregrine Fund.

